

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**  
**АНТИ-АНГИН® ФОРМУЛА**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N015460/01 от 15.12.2008 г.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: АНТИ-АНГИН® ФОРМУЛА

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:

Хлоргексидин + Тетракаин + Аскорбиновая кислота &

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки для рассасывания



**СОСТАВ НА ОДНУ ТАБЛЕТКУ:**

Активные вещества:

Хлоргексидина диацетат.....2,00 мг  
Тетракаина гидрохлорид.....0,20 мг  
Аскорбиновая кислота.....50,00 мг  
Вспомогательные вещества: левоментол, сахарин, сорбитол, кремния диоксид, магния стеарат, ароматизатор «анисовый», ароматизатор «мятный», краситель азорубин (Е-122).

**ОПИСАНИЕ:**

Таблетки плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:**

Антисептическое средство + местноанестезирующее средство.

КОД АТХ: [R02AA20]



**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие, преимущественно, в отношении грамположительных бактерий и *Candida albicans*, и в меньшей мере, против грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli*, *Selenomonas spp.* и анаэробных бактерий. Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus sanguis*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella veillonella*. Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие. Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.



**ПОКАЗАНИЯ:**

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтит, начальная стадия ангины, состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др).



**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

– повышенная чувствительность к компонентам препарата;  
– детский возраст до 5 лет;  
– I триместр беременности.

С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, период лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гиперкальциемия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.



**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Местно. Держать во рту до полного рассасывания.  
Взрослые и дети с 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа.  
Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 часа.  
Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.



**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Аллергические реакции.  
Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.



**ПЕРЕДОЗИРОВКА:**

Симптомы передозировки: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.  
Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.



**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:**

Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов. Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина. Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.



**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод). Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.



**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Таблетки для рассасывания.  
По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистер ПВХ/Al.  
По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.



**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!



**СРОК ГОДНОСТИ:**

3 года. Не применять по истечении срока годности.



**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:** без рецепта.

**ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:**

ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 VN Зеевольде, Нидерланды.

**ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ВАЛЕАНТ»:**

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия  
Тел./факс: +7 (495) 510-28-79



Size 150x239  PANTONE 361 C  
 Black

Size 150x239  PANTONE 361 C  
 Black