

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **ЭВКАЛИПТ-М**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N012101/01 от 02.03.2009 г.

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ЭВКАЛИПТ-М

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки для рассасывания



СОСТАВ НА ОДНУ ТАБЛЕТКУ:

Активные вещества:

Левоментол.....6,00 мг
Эвкалиптовое масло.....5,50 мг

Вспомогательные вещества: сахарин, сорбитол, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, ароматизатор «медовый», краситель хинолиновый желтый Е-104, краситель индигокармин Е-132.

ОПИСАНИЕ: таблетки плоские круглые со скошенным краем, светло-зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с запахом ментола и эвкалипта. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.



ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антисептическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: [R07AX]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и глотки (фарингит, ларингит, трахеит).



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 8 лет, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым: по 1 таблетке 3-4 раза в день. Детям с 8 лет: 1-2 таблетки в день.

Длительность лечения не должна превышать 5 дней.



ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Аллергические реакции, в редких случаях – диспепсические явления. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: до настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

При одновременном использовании эвкалипта и антидиабетических препаратов возможно снижение уровня содержания глюкозы в крови и симптомы гипогликемии.

Эвкалипт может увеличивать токсичность растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды, которые могут повреждать печень. Следует избегать совместного применения.



ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: при сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ:

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).



ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки для рассасывания. По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистере ПВХ/АI. По 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Не применять по истечении срока годности.



УСЛОВИЯ ОТПУСКА: без рецепта.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 VN Зеевольде, Нидерланды.

ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ВАЛЕАНТ»:

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

Тел./факс: +7 (495) 510-28-79

